

Die rechtlich erforderlichen Hinweise zum Datenschutz finden Sie [hier](#)

Liebe Eltern! Nach fast 31 Jahren habe ich am 1.4.2015 meine Praxis abgegeben. Auf meiner Homepage können Sie in Zukunft wichtige Informationen einsehen.

Die aktuelle weltweite **Corona-Virus-Pandemie** verlangt neben 1,5-2 m Abstand, Lüften, Mundschutz in Innenräumen und bei weniger als 1,5m Abstand draußen.- 30 sec. Seife-Händewaschen (tötet LipidOberfläche des Viruskapsids).

Isopropanol

67%

, und UVA 254 nm deaktivieren das Virus.- Nach

2 Tagen Fieber >38,5°C, heiser-schmerz-haftem Husten bitte Arzt informieren! Der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test der Fa. Roche :

"Schnelltest" weist ab 5. Tag nach Ansteckung Corona-befall und -Infektiosität nach. Erst 5 Tage nach Kontakt mit Corona-positiv getestetem Patient kann dieser Test beweisen, daß man selbst positiv=angesteckt ist oder nicht. Der

PCR-Corona-Gentest weist sofort nach Kontakt die Infektion nach, jedoch nicht das Ende der Ansteckungsgefahr für andere. Labore benötigen 1-2 Tage Zeit zur Auswertung.

Seit 2002 arbeiten Forscher an mRNA-Impfstoffherstellungen gegen Infektionen und Tumoren.

Der **Corona**-Impfstoff BNT162b2 **Comirnaty**^R von BioNTech/Mainz-Pfizer/USA ist seit 21.12.2020 in EU zugelassen, wird in Zentren geimpft, (da -70° Kühlkette; der

Spike-mRNA-abschnitt in Nanopartikel (LNP) gehüllt kodiert Rezeptordomäne des Spike-Proteins von SARS-CoV-2). Durch Antikörperproduktion gegen SARS-CoV-2 Spike-Rezeptorbinde-Protein sind ab 15. Tag geimpfte zu >95% über Jahre gegen Covid-19 Infektion geschützt. Geimpfte können nach 2. Impfung ungeimpfte zu 90% nicht anstecken, da die Impfung die Produktion von SARS-CoV-2 Viren stoppt. Das LNP-Lipid-Nano-Hüllprotein ist ein - auch im menschlichen Körper vorhandenes - Molekül, was den Transport des mRNA-Spike-Abschnitts sichert. mRNA-codierte Protein-synthesen laufen permanent im Plasma (RER) menschlicher Zellen seit Millionen Jahren ab, ohne daß mRNA Zugang zum Zellkern haben kann. "Mutationen der menschlichen DNA, Tumorentstehung, Hormon-, Fruchtbarkeits- oder Schwangerschafts-Störungen" sind ausgeschlossen. Die Zulassung für Impfungen von 12 bis 15-jährigen folgt ca.9/21. Zur Zeit ist Comirnaty

R

ab 16. Geburtstag (bald 12., 2022 6. LJ.) zugelassen. Impfschäden sind durch die Hersteller versichert, nachdem die EMA die EU-Zulassung erteilt hat. Zudem zeigen >781,5 Mio.Impfungen (12.4.2020) weltweit keine bleibenden Schäden, aber gute Verträglichkeit und hohe Schutzwirkung auch gegen 16 Mutanten, z.B.: B.1.1.7(GB), B.1.351(Afrika) und P.1 (Brasilien). Je mehr Menschen nicht geimpft sind, umso mehr können gefährliche Mutanten in infizierten Menschen entstehen, die zusätzlich Erkrankungs- und Todesfallzahlen erhöhen ! Daher ist die Corona-Impfung dringend ärztlich auch für Kinder angeraten. Der BioNTech-Impfstoff wird mit 2 Mia. Dosen in 2021 zur Verfügung stehen. Comirnaty ist nach Auftauen 120 Std. im Kühlschrank sicher lagerbar.

Der **Curevac-mRNA-Impfstoff**/Tübingen wird weiter entwickelt.

Moderna Biotech-mRNA-1273/USA ist 2. (ab 18.Geburtstag) zulassener m-RNA-Impfstoff mit wohl 86%-94% Wirkung, mehr Rötung, Schwellung, Schmerz und Fieber als Comirnaty

R

Der Oxford-ChadOx1-Vektor-Lebend-Impfstoff von ASTRA-Zeneca ist wohl mit **59,5% Wirksamkeit**

(EMA-Zulassungsdaten) nicht so wirksam wie die mRNA-Impfstoffe, Antikörper gegen das Schimpansen-Adenovirus, dessen DNA-Partikel mRNA veranlaßt, Spike-Protein zu synthetisieren, können als Folge gebildet werden. Ohne Paracetamol kommt es in >30%

zu starken Nebenwirkungen wie hohem Fieber, Kopf- u. Muskelschmerz, Rötung, Schwellung an der Einstichstelle, die zu je 1 Tag Arbeitsunfähigkeit geführt haben. Widersprüchliche Empfehlungen: z.Zt. in GB: ja für >30-j., D: nicht 18-60-jährige Frauen, vorher nicht über 65-jährige und

Thrombembolie-Zwischenfälle verunsicherten.

Angesichts von 1204 Neuinfektionen am 8.6.21 bei weiter sinkender Inzidenz (22,9) und 38.245.152 Geimpften(1x) , aber 89.390 Todesfällen und 3,71 Mio. positiv getesteter, weltweit >3,74 Mio. Covid-19-Toten und 174 Mio. positiv-getesteter ist Leugnen ein Zeichen von Ignoranz. Staatsanwälte und Ärztekammern leiten Gerichtsverfahren gegen Ärzte ein, die als Verschwörungs-Erzähler Corona-Gefahren leugnen, falsche Atteste ausstellen und zu -die Gemeinschaft in Gefahr bringendem Handeln- ermutigen. Bis zur Durchimpfung von über 55.000 Deutschen ist Maskenpflicht, Abstand >1,5-2 m, Händedesinfektion einzig wirksamer Schutz ! Trotzdem gibt die stetig sinkende Zahl der SARS-CoV-19 Neu-Infektionen Hoffnung. Mutationen können durch Anpassung und Neuproduktion von mRNA-Impfstoffen (BioNTech) beherrschbar werden. Ein QR-Code als fälschungssicherer digitaler Impfpfäß ist nach anderen EU-Ländern auch in Deutschland noch 2021 zu erwarten. Damit könnte bei weiter sinkender Infektion auf Testen z.gr.T. verzichtet werden. Die niedrige Inzidenz ist Grund für Zurückhaltung bei Kindern bis 16 Jahre , da das Risiko einer Covid-19-Erkrankung sehr gering ist, mögliche Nebenwirkungen deshalb schwerer wiegen.

Gardasil^R Schutzimpfungen gegen Krebs und Genitalwarzen werden von Krankenkassen ab 9. Geburtstag für alle Kinder

finanziert. Es reichen bis 15. Geburtstag

2

Impfungen

im

Abstand

von

6 Monaten

. Das Ziel

ist, in Zukunft

alle Menschen

vom

3.-

56.

Geburtstag

gegen mindestens 15 HPV-Krebsarten und 2 HPV- Genitalwarzen zu schützen ! Die

9-valente Gardasil

^R

verhindert 90%

aller

HPV-erkrankungen, ist für 9-26-jährige zugelassen und in Apotheken erhältlich. Nach

Gardasil-4

^R

ist die Fortführung des HPV-schutzes mit

Gardasil-9

R

(mit den Subtypen 6-11-16-18-31-33-45-52-58)

sinnvoll .

Nach 10 Jahren ist je nach Schutz-Titer eine neue erweiterte HPV

-Impfung, die auch gegen bestehenden Krebs wirkt, ratsam.

Baby´s werden seit 2015 **2x Prevenar^R** geimpft, ab 8/2020 reicht **2x 6-fach- !! DTPaHIB-HB-Polio**-Impfung (STIKO-Epid.Bull 34), sinnvoll ab 4. Monat mit 5200g, 2. Impfung mit 6-8 Wochen Abstand! (Infanrix hexa

R

hat 30IE Diphtherie-, Hexyon

R

/ Vaxelis

R

20IE Diphth.Toxoid). Die

wichtige Auffrischung

von Prevenar

R

und 6-fach-Impfung sollte zum 1. Geburtstag und frühestens nach 6 Monaten erfolgen.

Schutzmaßnahmen für Neugeborene

sind neben Mundschutz und Hände-desinfektion die

Booster-TdPa-Polio

für

Schwangere

,

dazu

HBV,

MMR-VZV-

,

Pneumococcen

13

-, Meningococcen-ACWY-, -B-Impfungen

auch

bei

Geschwistern

und

Eltern

.

Säuglinge

werden deutlich besser durch

mütterliche Keuchhusten-Impfung

(TdPaPo)

in der

22.SSW □ geschützt

, als mit einer 6-fach-Impfung in der 9. Lebenswoche. Die neue

Shingrix

R

VZV (Gürtelrose-Windpockenimpfung) sollte Erwachsenen lebenslang Schutz vor Hirn-und Nerven-zerstörenden Windpockenviren geben, eine ähnlich gute Vaccine für Kinder kommt. Bei Risikobabys kann eine Hepatitis-B-, Prevenar

R

-und Meningococccen-ACW

135

Y-B-Impfung sinnvoll in die 6. Lebenswoche vorgezogen werden. 3x 6-fach-Impfungen sind bei Risikofrühgeborenen im 1. Halbjahr sinnvoll.

41.000 **Masernerkrankungen** mit 37 Todesfällen im ersten Halbjahr 2018 in EU, 2 Mio. Masernfälle mit 2000 Todesfällen weltweit, 200.000 Menschen mit neurologischen Spätfolgen wie Taubheit, Anfallsleiden in 2018 beweisen die Notwendigkeit des Impfschutzes. Ein Masernkranker kann 15 Gesunde infizieren! Die nach dem 1.Geburtstag durchgeführte MMR-VZV Impfung schützt in fast 100 % **über 10 Jahre** vor Masern und

Röteln, jedoch

nur 5

Jahre vor Mumps

! Die 4-fach MMR-VZV-Impfung verdoppelt den Schutz vor Masern, sollte daher nur noch geimpft werden. Maserngeimpfte können "

Impfmasern

" ab 8.Tag nach Impfung mit Fieber, z.T. zusammenlaufenden roten Flecken durchmachen. Alle geimpften können 14 Tage nicht geimpfte, Säuglinge und Immundefekt-Kranke durch Speichelkontakt infizieren. Die

Masernimpfung □ (MMR-VZV) ist

Voraussetzung

für die Aufnahme

in

KiTa, Kindergarten

und

Schule.

Trotzdem

fehlt bei vielen Kindern der Impfschutz, andererseits werden schon geimpfte Kinder in 4-Wochen-Abstand ein 2. Mal geimpft, in Sachsen folgt die Boosterimpfung mit 6 Jahren! (Falschmeldungen eines englischen Chirurgen, der nach Entzug seiner Arztzulassung in Texas weiter hoch-manipulativ Propaganda gegen Masern-Impfung streut, sind verantwortungslos). Tödliche Masern breiten sich durch unverantwortliche Impfverweigerung weltweit wieder aus. An Masern sterben jährlich weltweit 40.000 Kinder, die Impfung hingegen schützt Milliarden Kinder.

Menveo^R - seit 4/2010 in EU zugelassener und auch in der Schweiz empfohlener ACW₁₃₅Y - CRM

1

97

- Meningococccen- Impfstoff- (auch Nimenrix

R

) schützt vor 43% aller Meningococccen-Hirnbakterien-Erkrankungen (RKI 2018) und hat die Meningococccen-C-Impfstoffe weltweit abgelöst; Meningococccen-C-Impfungen schützen nur 7% der Kinder.

Bexsero^R - seit 2.12.2013 zugelassener recombinanter 4-Pepton-reverse-Transcriptase Meningococccen-B Impfstoff schützt vor 57% aller Meningococccen-Hirnbakterien-Erkrankungen in der EU. Alle Säuglinge, Kinder-Jugendliche sollten gegen Men-B (wie auch Men-ACWY) geimpft werden. Nur so könnten jährlich über 500 Meningococccen-Hirnerkrankungen in Deutschland vermieden werden. In England halbierte eine einzige Bexsero

R

-Impfung bei 1-Jährigen die Zahl der B-Meningococccen-erkrankungen!

"Grippe"=Influenza-Virusinfektion. Der neue *quadrivalenter* Impfstoff : A/ Hawaii/70/2019, (in Huhnei: A/Guangdong-Maonan/SWL 1536/2019) = A/H

1

N

1

pdm09; A/

Hon Kong/2671/2019 = A/H

3

N

2

2019 ; B/ Washington/02/2019

= Linie B/Victoria; B/ Phuket/3073/2013 = Linie B/ Yamagata/16/88 ist als

Fluad

Tetra

für >60-jährige wirksamer als

Flucelvax

, Vaxigrip oder Influxac

Tetra

für Kinder u. Erwachsene bis 59 Jahre.

- 2019/2020

enthielt der Grippe-Impfstoff: A-Brisbane-02/2018-ähnlich-H1N1, A/Kansas-14/2017-H3N2, B/Colorado-06/2017-ähnlich Victoria-2/87, B-Phuket-3073/2013; - 2018/19: A/Michigan/45/2015 H1N1, A/Singapore/ H3N2; B/Colorado/06/2017, B/Phuket/3073/2013 like).- 2018/19 registrierte

das RKI

333.567

Erkrankungen , 18% der Grippekranken wurden stationär behandelt,

1665

Menschen starben an Grippe. An B-Phuket-Grippe erkrankten Dez.2017-Apr.18: 68%, an A-H1N1-Grippe 28% , 4% an A H3N2 .

25.000

Menschen starben. Der

rabattierte 3-fach

-Impfstoff mit

A-H1N1

/ Michigan/45/2015, schwach-schützendem

A-H3N2

/ Hongkong/ 4801/ 2014,

B

/

Brisbane

/60/2008 like virus war Schuld:

nur im 4-fach-Impfstoff

war

B

/

Yamaga-like Phuket

/3073/2013 like virus

-

-

Italienisch heißt Influenza: Einfluß der Kälte: Wassertröpfchen sind bei Kälte kleiner als in Wärme, voller Viren können sie weiter fliegen, mehr anstecken.

Grippe

heißt übersetzt: plötzlich er

"greift"

ein gefährlicher Influenzavirus den bislang gesunden Menschen: Kinder haben hohes Fieber

,

heiseren Husten

,

Luftnot

,

Kopf-, Gelenk-, Muskel-, oft Bauchschmerz mit Erbrechen

, Lungenentzündung, Erwachsene Herzinfarkte.

Südhemisphären-Reisende bringen Influenza mit.

Moderne Grippe-Impfstoffe wie:

Fluenz*nasal

(f.Kinder 2.-18.* Geburtstag), virosomale Impfstoffe fehlen z.Zt.

Spaltimpfstoffe

wirken bei >6 Mon. Säuglingen, Kleinkindern und >50-jährigen ca.

40%

und nur

4 Monate

: Früh im Oktober geimpfte haben ab Februar kaum Schutz.-Der PCR- Schnelltests ermöglicht eine rationellen Versorgung von ungeimpften Erkrankten mit Tamiflu

R

(Oseltamivir) am 2.Tag, dem mit 76% hochwirksamen Grippemittel.- Die Aufklärung über die z.T. tödliche

Influenza

wird erschwert durch falsche Verwendung des Wortes Grippe:

"Augengrippe" ist eine Adenovirus-Typ 8- /19- Ceratoconjunctivitis, also keine Influenza ("Grippe")

!

"Grippale" Infekte gibt es nicht

, wohl aber fast 300 verschiedene Kleinbläschen-Enterovirus-

Coxsackie

-infektionen wie Hand-Fuß-Mundkrankheit, dazu Parecho-, Entero-, Herpes-, Adeno-, Rhino-, Parainfluenza-, Metapneumo-, Noro-,Rota-Virus-Infektionen sowie bakterielle (meist) Superinfekte

!

Mit Kälteeinbruch im Oktober-Nov. erkranken viele an Schnupfen-Husten-Heiserkeit durch Adeno-Rhino-Parainfluenza-Viren. Diese Infekte sollten nicht mit "Grippe"= Influenza verwechselt werden!

Alle Virusinfektionen

sind in

85%

über Speichel-tröpfchen hochansteckend.

In China ist ein neuer effektiver Impfstoff gegen **Hand-Fuß-Mundkrankheit Enterovirus**

A71=Coxsackie A16

zugelassen. Er schützt in >90% . Jährlich starben in Asien über 650 Kinder an den Folgen der Infektion.

HFM

-Impf-Neben-wirkungen sind Fieber, Erythem, Lymphknotenvergrößerung. Es gibt

über 300

Coxsackie-Enteroviren

, die Mundschleimhaut-Aphthen, Leberentzündung... verursachen. Gegen

Malaria

wirkt zu 100% ein neuer Lebend-Impfstoff.

Mücken übertragen auch in Deutschland zunehmend das gefährliche

Ostnil-Fieber

!

Ebola

-Virus-Endemie in Mittelwest-Afrika mit

>10.000 Erkrankte

n, über 5000 Toten ist keine Pandemie. Ohne Seuchenhygiene und medizinischer Versorgung in Kriegsgebieten konnte sich die Erkrankung in Sierra Leone, Guinea, Liberia ausbreiten. Zunehmend hohes Fieber, Durchfall sind die unspezifischen Zeichen. Infektiös sind Erbrochenes, Urin, Stuhl, Schweiß, Speichel, Blut. Bei häuslicher Pflege werden so pflegende Angehörige infiziert. Der

monovalente

Ebola-Impfstoff (

rVSV-ZEBOV

von Winnipeg/Canada Health-Agency 2004 entwickelt) enthält gentechnisch modifiziertes Vesicular-Stomatitis-Virus VSV mit Zaire-EbolaVirus-Glycoprotein auf seiner Oberfläche (Capsid), was Antikörperbildung induziert und der

bivalente cAd3-ZEBOV

von GSK mit Schimpansen-Adenovirus+nichtinfektiöse Gensegmente zweier Ebolaviren, T-zellen des Empfängers synthetisieren virale Proteine, die auf Zell-Oberflächen Immunantwort erzwingen.

Die WHO-zahlen anderer Leiden 2013 sind: **1,5 Mio. Kinder** sind an Diarrhoe, **1,5 Mio.** Durch Nicht-Impfung Erwachsener sterben

jährlich

viele Kinder, ca. 300.000 Menschen starben an Keuchhusten.

10 Mio. Menschenerkrankten jährlich an

Tuberkulose

(die Zahl resistenter TBC-Erkrankungen explodiert 2017!)

1,5 Mio

. Menschen sterben jährlich je an

TBC und

AIDS

. Covid-19 positiv sind bis 15.8.20 weltweit: 21.5 Mio., davon über 771.518 Menschen gestorben.

Liebe Eltern ! Ratschläge zum Impfen finden sie auf:

<http://www.dr-wolschner.de/impfungen!>

Genetik und Epigenetik: Die lange Diskussion über: Was ist festes Erbe und was formt den Menschen hat vorerst eine Lösung gefunden: 50% ist von Genen bestimmt, die Kinder von Eltern erben, 50% sind epigenetische Eiweißformungen, die durch Zuwendung, Erziehung, Umwelt Teile der DNA (des Erbgutes) abdecken oder freigeben. Die Epigenetischen Eiweiße werden wie die DNA weiter über Generationen vererbt. Durch Fast- food, mangelhafte

Zuwendung, Nikotin, Alkohol, Drogen, Umweltgifte können wir uns nicht nur selbst, sondern auch unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln schaden **! So tragen wir viel Verantwortung, wenn wir Kinder in die Welt begleiten !**

Zahlen zur Umweltschutzdiskussion: Die Produktion von Batterien für 1 e-PKW belastet die Umwelt wie 160.000 km weiterfahren mit Alt-Diesel-Pkw. In Hamburg Straßen gesperrt, 1 km Luftlinie davon blasen Riesen-Luxuskreuz- und Containerschiffe jährlich ein Vielfaches (i.Vgl.zum Stadtverkehr) an NO_x, CO₂ und Feinstaub in die Stadtluft. Ein paar deutsche Luxusschiffriesen belasten die Umwelt in einem Jahr mehr als der gesamte Dieselverkehr in Deutschland. 31% der NO_x-Belastung verursachen LKW (UBA 2012), Silvesterfeuerwerke machen bundesweit 15,5% der Gesamtfeinstaub-emission aus. 4 Adventskerzen emittieren 480 µg/Stunde Feinstaub. Pro Zigarette inhaliert ein Raucher 40 µg NO_x. Es gibt effiziente alternative Öko-Treibstoffe für Diesel- und Benzinmotoren ohne NO_x und CO

²

-Abgas, bald Wasserstoffmotoren.